


TEDAVİYE
BAŞLADIKTAN
SONRA
İYİLEŞME BELİRTİLERİ
GÖRÜLDÜĞÜNDE
İLAÇLARINIZI İÇMEYİ
BIRAKMAYINIZ,
TEDAVİNİZİ
TAMAMLAYINIZ!



VEREMSİZ BİR



TÜRKİYE!

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Mah. A. Adnan Saygun 2. Cad. No:55
06100/ Sıhhiye/ Çankaya/ Ankara
Tel :+90 312 565 50 00

hsgm.saglik.gov.tr



Hedefimiz
VEREMSİZ
Bir Türkiye!




hsgm.saglik.gov.tr

ÜLKEMİZDE TÜBERKÜLOZ (VEREM) HASTALIĞININ TEDAVİSİ ÜCRETSİZDİR!

- ▶ TÜBERKÜLOZ kalıtsal değil, bulaşıcı bir hastalıktır.
- ▶ TÜBERKÜLOZ, tedavi edilebilen bir hastalıktır.
- ▶ TÜBERKÜLOZ tedavisi en az 6 aydır. İlaça dirençli tüberkülozda bu süre uzamaktadır (18-24 ay).
- ▶ Hastaların çoğunda tedavi başladıktan 2-3 hafta sonra bulaştırıcılık yok olur.



“**Düzenli ilaç kullanımı ile
Tüberkülozu Önleyebilir,
Çevrenizdekilere
Bulaşmasını
Engelleyebilirsiniz.**”



Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT);

Tüberküloz hastasının tüm tedavi süresince ilaçlarının her dozunu bir görevli ya da gözetmen eşliğinde içmesidir.

“**Etkili ve başarılı
bir tedavi için
Doğrudan Gözetimli
Tedavi gereklidir.**”

- ▶ Tedaviye başladıktan bir süre sonra iyileşme belirtileri görüldüğünde ilaçlarınızı içmeyi bırakmayınız, tedavinizi tamamlayınız.
- ▶ Düzensiz ilaç kullanımı tedavinizi zorlaştırır, bulaştırıcılık devam eder.
- ▶ Düzensiz ilaç kullanımı dirençli tüberküloza yol açmaktadır.
- ▶ Dirençli tüberküloz daha uzun süreli ve daha fazla ilaç kullanımını gerektirir.
- ▶ İlaçlarınızı kullanırken beklenmeyen bir etki ile karşılaşırsanız *en kısa sürede* hekiminize başvurunuz.